

CODAZZURRA COMUNE

Nome scientifico: *Ischnura elegans*
Famiglia: Coenagrionidae



Dimensioni: lunghezza 3– 3,4 cm, apertura alare 2,6– 4,2 cm.

Descrizione: maschi azzurri, addome nero eccetto l'ottavo segmento; femmine con tre diverse forme cromatiche:

Forma A da immatura lillà, matura simile alla livrea del maschio;

Forma B da immatura simile alla forma A, da matura verdastra o brunastra;

Forma C da immatura rosata, da matura simile alla forma B ma le zampe non sono nere;

Le femmine presentano sempre l'ottavo segmento addominale bruno.

Distribuzione: Europa e Asia Settentrionale, localmente sostituita da specie congeneri.

Habitat: ubiquitaria, in grado di adattarsi anche ad acque salmastre.

Riproduzione: più generazioni all'anno. Le uova sono deposte nei tessuti di piante acquatiche vive o morte. Schiudono in 2– 4 settimane. Lo sviluppo è completato in 11 stadi, da poche settimane fino a 2 anni.

Alimentazione: insetti, anche altre libellule.

Osservazione in Torbiera: presente tutto l'anno e molto comune. Facilmente avvistabile sulla vegetazione delle briglie.

